PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 01/2022

127 – MÉDICO – INFECTOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **30** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE À FUNÇÃO QUE VOCÊ SE INSCREVEU, HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTE CADERNO ENCONTRA-SE COMPLETO E LEGÍVEL, HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO ESTABELECIDO NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES

instituto mais.org.br
O Futuro é nosso Presente

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

1. Acerca do vencimento, é correto afirmar que é a

(A) retribuição pecuniária fixada em lei, devida ao servidor pelo exercício do cargo.
(B) vantagem pecuniária acrescida ao salário do servidor.
(C) remuneração pecuniária pelo exercício do cargo.
(D) retribuição como prêmio, por tempo de exercício do cargo.

2. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a _____ da remuneração, ficando o desconto a critério da administração.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) 15% (quinze por cento)
(B) 20% (vinte por cento)
(C) 25% (vinte e cinco por cento)
(D) 30% (trinta por cento)

3. Perderá o direito às férias o servidor que, no período aquisitivo, houver gozado, dentre outras, da licença para tratamento de saúde

(A) superior a 180 dias.
(B) superior a 90 dias.
(C) por 60 dias.
(D) por 30 dias.

4. O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade e com a autorização da chefia imediata, poderá ser

(A) antecipado, prorrogado ou compensado.
(B) apenas antecipado.
(C) antecipado ou compensado.
(D) prorrogado ou compensado.

5. São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, pela natureza, pelas condições ou pelo método de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, em razão do(a)

(A) natureza e do tempo de exposição aos seus efeitos.
(B) tempo de exposição aos seus efeitos, apenas.
(C) natureza de exposição aos seus efeitos, apenas.
(D) local de trabalho, ainda que não seja de forma habitual.

POLÍTICAS DE SAÚDE

6. Sobre o preenchimento da Declaração de Óbito (DO), assinale a alternativa correta.

(A) Deve-se preencher para óbito fetal se a gestação teve duração igual ou superior a 15 semanas, ou o feto tiver peso igual ou superior a 400 gramas, ou estatura igual ou superior a 20 centímetros.
(B) Deve-se preencher em casos de óbitos de causa natural, apenas.
(C) Quando a criança nascer viva e morrer logo após o nascimento, independentemente da duração da gestação, do peso do recém-nascido e do tempo que tenha permanecido vivo, deve-se preencher.
(D) Peças anatômicas amputadas devem ser enviadas juntas com a DO.

7. De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise as proposições abaixo.

I. Para a admissão de agentes de combate às endemias, por gestores locais, não será necessária a realização de processo seletivo.
II. É lícita a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
III. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I, II e III.

8. Sobre a Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
(B) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
(C) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu exercício básico.
(D) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.

9. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma

(A) hierarquizada e centralizada em níveis de atenção decrescente.
(B) regionalizada por demanda de cuidados, com os níveis de atenção decrescente.
(C) regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
(D) hierarquizada em níveis de complexidade crescente e de forma centralizada.

10. Sobre os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), que serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados, assinale a alternativa que apresenta o órgão que realizará a fiscalização.

(A) Organização Setorial de Investimentos (OSI).
(B) Fundo Nacional da Saúde (FNS).
(C) Secretaria da Saúde.
(D) Conselho de Saúde.

11. Sobre os indicadores em saúde, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

( ) Morbidades são medidas utilizadas para descrever e analisar uma situação existente, avaliar o cumprimento dos objetivos, as metas e suas mudanças ao longo do tempo, além de prever tendências presentes.
( ) Mortalidade representa a intensidade com que os óbitos por uma determinada doença ocorrem numa certa população.
( ) Coeficiente de mortalidade geral mede o risco de morte por causa exclusiva em uma população de um dado local e período.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(A) F / V / F
(B) V / V / F
(C) F / F / V
(D) V / V / V

12. Sobre a história natural e prevenção de doenças, acerca das categorias e seus respectivos fatores, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Fatores sociais.	A.	Inundações/secas.
2.	Conduta humana.	B.	Restrição ou redução de programas preventivos.
3.	Infraestrutura de saúde pública.	C.	Atividades ao ar livre.
4.	Mudanças ambientais.	D.	Conflitos civis e armados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(A) 1A / 2B / 3C / 4D
(B) 1D / 2C / 3A / 4B
(C) 1C / 2A / 3B / 4D
(D) 1D / 2C / 3B / 4A

13. Assinale a alternativa que apresenta o número de blocos obrigatórios que compõem a DO.

(A) 7.
(B) 8.
(C) 9.
(D) 10.

CLÍNICA MÉDICA

14. O hipotireoidismo é caracterizado pela redução nos níveis séricos dos hormônios tireoidianos, tendo duas classificações, primário e central. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Quando a deficiência dos hormônios tireoidianos é decorrente da incapacidade parcial ou total de síntese hormonal pela glândula tireoide, classifica-se como central.
(B) Quando ocorrida pela diminuição da produção ou bioatividade do TSH como resultado de disfunção hipotalâmica ou hipofisária, classifica-se como primário.
(C) Quando ocorrida pelo aumento da produção ou bioatividade do TSH como resultado de disfunção hipotalâmica ou hipofisária, classifica-se como central.
(D) Quando a deficiência dos hormônios tireoidianos é decorrente da incapacidade parcial ou total de síntese hormonal pela glândula tireoide, classifica-se como primário.

15. Inibidores de Bomba de Prótons (IBP) são utilizados na prevenção de úlceras pépticas em pacientes que necessitam fazer uso prolongado de AINE. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de IBP.

(A) Famotidina.
(B) Misoprostol.
(C) Omeprazol.
(D) Carbonato de Cálcio.

16. Através do fungo *Streptomyces griseus* foram obtidos antibióticos como estreptomicina e, posteriormente, surgiram a gentamicina, a tobramicina e a amicacina, que são pertencentes

(A) aos ß-Lactâmicos.
(B) às lincosaminas.
(C) aos nitroimidazólicos.
(D) aos aminoglicosídeos.

17. Paciente que faz uso de colchicina para tratamento de gota apresenta risco aumentado para

(A) a má absorção de B_{12}.
(B) evento de tempestade elétrica.
(C) hipertensão pulmonar.
(D) depressão respiratória e motora.

18. Pacientes portadores de HAS, que fazem uso de terapia prolongada de diuréticos tiazídicos, como hidroclorotiazida, apresentam risco aumentado, diretamente, para

(A) hipernatremia.
(B) hipocalemia.
(C) hipermagnesemia.
(D) hipercalemia.

19. Sobre o tratamento da doença de cólera, assinale a alternativa correta.

(A) Administrar solução de Sais de Reidratação Oral (SRO) em casos brandos e fluidoterapia intravenosa em casos graves, concomitante, ao uso de antibioticoterapia via oral, como tetraciclina.
(B) Realizar fluidoterapia intravenosa em todos os casos e iniciar antibioticoterapia com penicilina intramuscular.
(C) Hidratar com SRO em casos brandos e fluidoterapia intravenosa em casos de choque, concomitantemente, iniciar antifúngico por via intravenosa, como anfotericina B.
(D) Realizar fluidoterapia intravenosa em todos os casos e iniciar antifúngico, tendo como primeira escolha a doxiciclina por via oral.

20. Sobre o esquema vacinal, assinale a alternativa correta.

(A) A vacina BCG é constituída pela bactéria atenuada.
(B) A vacina contra hepatite B é composta pela bactéria inativada.
(C) A Vacina contra a Poliomielite (VOP) é constituída pela bactéria viva atenuada.
(D) A vacina DTP é constituída pela bactéria viva inativada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), assinale a alternativa que apresenta o fármaco para o tratamento da filaríase.

(A) Praziquantel.
(B) Mebendazol.
(C) Tiabendazol.
(D) Dietilcarbamazina.

22. A febre reumática é uma doença sistêmica, não supurativa, devido à complicação tardia, causada pelo *Streptococcus* Beta-hemolítico do Grupo A – Lancefield – que ocorre em indivíduos geneticamente predispostos a desenvolver hipersensibilidade a antígenos liberados por esse germe. São sinais maiores da febre reumática, **EXCETO**,

(A) cardite.
(B) coreia.
(C) artralgia.
(D) nódulos subcutâneos.

23. Sobre a patogênese da pneumonia relacionada à assistência à saúde, é correto afirmar que está relacionada, especificamente, à transmissão cruzada

(A) biofilme em sondas (nasogástrica, nasoenteral) e tubo traqueal.
(B) virulência e número de microrganismos.
(C) colonização do trato digestivo e respiratório.
(D) esterilização ou desinfecção inadequada de dispositivos.

24. Após a avaliação da radiografia de tórax, o médico identificou uma pneumonia bacteriana lobular à esquerda de um paciente adulto. Frente ao achado, ele prescreveu um antimicrobiano carbapenêmico. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o medicamento que foi prescrito pelo médico.

(A) Imipenem.
(B) Amicacina.
(C) Oxacilina.
(D) Ciprofloxacino.

25. É o método oficialmente adotado no Brasil para o diagnóstico da malária. Mesmo após o avanço de técnicas diagnósticas, esse exame continua sendo um método simples, eficaz, de baixo custo e de fácil realização. O trecho refere-se ao método diagnóstico

(A) gota espessa.
(B) PCR.
(C) teste rápido.
(D) esfregaço molecular.

26. Benznidazol é o medicamento preconizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da

(A) doença de Chagas.
(B) toxoplasmose.
(C) leishmaniose.
(D) rickettsia maculosa.

27. Com relação à AIDS, assinale a alternativa correta.

(A) Raltegravir (RAL) 100 mg é um dos fármacos oferecidos pelo Ministério da Saúde para o controle da doença. É disponibilizado em comprimido mastigável e revestido.
(B) É a doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), que ataca o sistema imunológico, sendo as células mais atingidas os linfócitos T-CD8+.
(C) Janela imunológica é o intervalo de tempo decorrido entre a infecção pelo HIV até a primeira detecção de anticorpos anti-HIV produzidos pelo sistema de defesa do organismo. Na maioria dos casos, a duração da janela imunológica é de 12 dias.
(D) As mães que vivem com HIV têm 50% de chance de terem filhos sem o HIV se seguirem o tratamento recomendado durante o pré-natal, parto e pós-parto.

28. Com relação à sífilis, analise as proposições abaixo.

I. Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. Pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada ou para a criança durante a gestação ou parto.
II. Quando é detectada na gestante, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, com a penicilina benzatina, que é o único medicamento capaz de prevenir a transmissão vertical, ou seja, de passar a doença para o bebê.
III. A sífilis terciária manifesta-se com manchas no corpo, que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo.

É correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

29. No diagnóstico laboratorial das hepatites, são marcadores de agressão hepatocelular:

(A) bilirrubinas.
(B) proteínas séricas.
(C) Gama-Glutamiltransferase (GGT) e atividade de protrombina.
(D) Aspartato aminotransferase (AST/TGO) e a Alanino aminotransferase (ALT/TGP).

30. Sobre a latência clínica e a fase sintomática da infecção pelo HIV, assinale a alternativa **INCORRETA**.

(A) O exame físico costuma ser normal, exceto pela linfadenopatia, que pode persistir após a infecção aguda.
(B) Enquanto a contagem de linfócitos T-CD4+ (LT-CD4+) permanece acima de 350 células/mm^3, os episódios infecciosos mais frequentes são geralmente bacterianos, como as infecções respiratórias ou mesmo tuberculose, incluindo a forma pulmonar cavitária.
(C) A candidíase oral é um marcador clínico precoce de imunodepressão grave e foi associada ao subsequente desenvolvimento de pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*.
(D) Diarreia crônica e febre de origem indeterminada, bem como leucoplasia oral pilosa, não são preditores de evolução para AIDS.